COLOSTRO IMMUNOFORCE CF 800 gr

COLOSTRO IMMUNOFORCE CF 800 gr

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione Mangime complementare per vitelli, agnelli, capretti e annutoli.
NOTE TECNICHE:
L'assunzione di una adeguata quantità di colostro nelle prime ore di vita è il più importante, singolo fattore di prevenzione per le malattie neonatali del vitello, la somministrazione del colostro deve avvenire entro 2 /6 ore dalla nascita. I vitelli manifestano una carenza immunitaria da insufficiente somministrazione del colostro quando le immunoglobuline (IgG) ematiche a 24-48 ore sono utilizzato per determinare la qualità del colostro è la sua concentrazione in IgG. Un buon colostro ha una concentrazione maggiore di 50 mg/mL di IgG. La sua concentrazione è tuttavia molto variabile andando da 9 mg/mL a 186 mg/mL. e cause di tali oscillazioni sono collegate alle condizioni sanitarie della madre e all'ambiente in cui la stessa vive, in abbinamento alla sua età, condizione corporea, genetica e piano alimentare anche se altre non sono controllabili (genetica, età dell'animale). IMMUNOFORCE Igg può essere utilizzato come complemento al colostro materno o in totale sostituzione dello stesso.
Il prodotto va stemperato in acqua calda e somministrato per via orale in quantità adeguata in modo da assicurare al vitello la corretta assunzione di IgG. La somministrazione di IMMUNOFORCE Igg, così come quella del colostro materno, deve essere fatta il prima possibile ed entro pochissime ore dalla nascita.
ADDITIVI (per kg):
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo:
Vitamina A 3a672a _____ 25.000 U.I.
Vitamina D3 3a671 _____ 20.000 U.I.
Vitamina E 3a700 _____ 5.000 mg
COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):
Proteina grezza_____35,0 %
Grassi grezzi_____ 0,5 %
Fibra grezza_____0,1 %
Ceneri grezze_____2,8 %
COMPOSIZIONE:

Colostro bovino*(BHV1 Free), Destrosio anidro, Prodotti del lievito (Pareti cellulari di lievito da Saccharomyces cerevisiae).
INDICAZIONI D'USO:
Somministrare entro 6 ore dalla nascita come sostitutivo o complemento del colostro materno.
DOSI PER VITELLI E ANNUTOLI: può essere utilizzato come sostitutivo del colostro materno in un unico pasto da 200 g (circa 12 misurini) con un litro e mezzo di acqua ad una temperatura di 40°C o in qualità di complemento del colostro materno, ad un quantitativo pari a 2 misurini/capo a pasto.
DOSI PER AGNELLI E CAPRETTI: somministrare come sostitutivo del colostro materno, ad un quantitativo pari a 2
misurini in 150 ml di acqua ad una temperatura di 40°C.
Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto al riparo dei raggi diretti del sole.
CONTENUTO Min. 150.000 mg / Kg di IgG
*Prodotto esente da Brucellosi, TB, EBL (Leucosi), Johnes Disease, BHV- 1, BVD e BSE.